



УДК 75/75.042:598.2(410)"18"(084.1)
ББК 85,147(4Вел)я6
П 87

Автор текста, научный консультант
Евгений Коблик

Издательство "Белый город"
111399, Москва, ул. Metallургов, д. 56/2
Тел.: (095) 780-3911, 780-3912, 916-5595,
688-7536, (812) 265-4139
Факс: (095) 916-5595, (812) 567-5415

Директор Константин Чеченев
Директор издательства Андрей Астахов
Коммерческий директор Юрий Сергей
Главный редактор Наталия Астахова

Редактор Марина Панфилова
Оформление, подготовка иллюстраций: Михаил Трубецкой
Верстка: Любовь Комаровская
Сканирование иллюстраций: Ирина Вавилочева,
Ольга Калинина, Вячеслав Тулин

Отпечатано в Италии.
Тираж 3000

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращайтесь по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49 А, корп. 10, стр. 2
Тел.: (095) 780-3911, 780-3912
111399, Москва, ул. Metallургов, д. 56/2
Тел. (095) 916-5595
E-mail: belygorod@mail.ru

Птицы Азии / Автор текста Е. Коблик. — М.: Белый город, 2005. — 496 стр.: илл.

ISBN 5-7793-0970-1

Издательство "Белый город" с удовольствием представляет своим читателям первый альбом из серии "Красота природы". Книга впервые за последние полтора века знакомит отечественного читателя с творчеством выдающегося английского зоолога и художника-анималиста Джона Гульда.


ПТИЦЫ АЗИИ




Сермун

(Sthagin's cruentus)

Называется также кровавым фазаном из-за малиновых пятен на горле, брюхе и подхвостье. А из-за короткого хвоста и небольших размеров (длина 40–48 см, вес 410–650 г) сермун похож скорее на куропатку. На рисунке изображен номинальный подвид, распространенный в Непале.





Кундык Верро

(Tetraophasis obscurus)

Этих птиц называют еще моналовыми куропатками. Самец (длина 47 см, вес 900 г) крупнее самки, имеет схожую с ней окраску. Кундык Верро обитает в горах Западного Китая и на востоке Тибета. Предпочитает горные пихтачи, заросли рододендрона, альпийские луга с выходами скал на высоте 3000–4100 м. Немногочисленный вид.

Кавказский тетерев

(Lyrurus mlokosiewiczi)

Несколько мельче обыкновенного тетерева (длина 50 см, вес 1 кг). Обитает в поясе субальпийских кустарников и криволеся на Большом и Малом Кавказе. Летом часто поднимается до альпийских лугов (до 3300 м), зимой спускается в пояс хвойных лесов (от 800 м). На току самцы высоко подпрыгивают на одном месте, совершая кульбит в воздухе. Молчаливы, в полете издают крыльями свистящие звуки. Вид включен в Международную Красную книгу.





Тибетский улар

(Tetraogallus tibetanus)

Самый мелкий из уларов (длина 50 см, вес 1,6 кг). Обитает на востоке Памира, в Тибете, Гималаях и горах Западного Китая. На большей части ареала встречается совместно с гималайским уларом, но предпочитает более сухие и открытые места. Зимой не спускается ниже 3700 м, летом поднимается к снеговой линии до 5800 м. Относительно редкий вид.

Каспийский улар


(Tetraogallus caspius)



Уларов называют также горными индейками. Самка отличается от самца (длина 60 см, вес до 2,6 кг) лишь меньшими размерами. Улар — обитатель сухих скалистых склонов некоторых хребтов Малого Кавказа, Турции, Ирана, Туркмении (Копет—Даг). Встречается на высоте 1800—4000 м, совершает вертикальные сезонные кочевки. Редкий вид.


Гималайский улар

(Tetraogallus himalayensis)

Крупнее каспийского улара (длина до 72 см, вес до 3,6 кг). Населяет большинство горных систем Средней и Центральной Азии от Тянь-Шаня и Памиро-Алая до Гималаев. Встречается на высоте 3600—5100 м, преимущественно в поясе альпийских лугов и горных степей. Как и другие улары, великолепно затаивается на склонах, чаще обнаруживает свое присутствие громкими мелодичными свистами во время тока и при опасности. Потрясенные птицы слетают только вниз по склону, с характерным бульканьем и свистом крыльев, вверх поднимаются «пешком». Довольно обычный вид.







Пустынная куропатка

(Ammoderdix griseogularis)

Мелкая куропатка (длина 25 см, вес 200 г). Предпочитает пустынные предгорья, осыпи песчаника, лёссовые обрывы в Турции, Иране, Пакистане, на юге Средней Азии. Не встречается выше 2000 м. Распространение спорадичное. В Туркмении известна под звукоподражательным названием «чиль» из-за мелодичного свиста.

Арабская пустынная куропатка


(Ammoderdix heyi)

Называется еще песчаной куропаткой, однако на самом деле песков избегает. Размерами, обликом, биологией сходна с пустынной куропаткой. Обитает на Аравийском полуострове, в Египте и на северо-востоке Судана. В Палестине встречается на высоте ниже уровня моря.

Снежная куропатка

(Lerwa lerwa)

Биологией сходна с близкими родственниками — уларами и кундыками, но отличается от них меньшими размерами (длина 40 см, вес 600 г). Обитатель горных степей, альпийских лугов и каменистых россыпей на высоте 3000–5000 м в Гималаях и горах Западного Китая. Часто встречается у самой границы снегов.



Тибетская куропатка

(Perdix hodgsoniae)

Размерами сходна с бородатой куропаткой. Замещает родственных серую и бородатую куропаток в горных степях Тибетского нагорья и прилегающих районов Китая, Индии. Встречается на высоте 3600–5600 м. Довольно обычна.

Бородатая куропатка


(Perdix daurica)


Такое название получила из-за удлиненных перьев на горле. Известна также под именем — даурская куропатка. Ближайшая родственница европейской серой куропатки, сходна с ней размерами (длина 30 см, вес 300 г), обликом и образом жизни. Распространена в степях, лесостепях и полупустынях Азии от Казахстана и Узбекистана до Маньчжурии, Тибета, востока Китая. В горах поднимается на высоту до 3000 м. В большинстве районов обычный охотничий вид, в России на Дальнем Востоке редка, исчезает.

Чернобрюхий перепел

(Coturnix coromandelica)

Типом окраски напоминает обыкновенного перепела, однако размерами (длина 16 см, вес 80 г) уступает ему. Обитатель саванн, кустарниковых зарослей и культурных ландшафтов в Индии, на западе Бирмы и востоке Пакистана, в Гималаях встречается на высоте до 2000 м. Ведет оседлый образ жизни или совершает сезонные кочевки в зависимости от прихода муссона.





Индийский джунглевый перепел

(Perdicula asiatica)

Немного крупнее чернобрюхого перепела (длина 15–18 см, вес 60–80 г). Обитает в сухих кустарниковых биотопах, саваннах, листопадных редколесьях Индийского субконтинента и острова Шри-Ланка. В горах встречается на высоте до 1200 м. Обычный вид.

Скальный джунглевый перепел

(Perdicula argoondah)

Размерами и окраской сходен с индийским джунглевым перепелом. Распространен на западе и юге Индии. Предпочитает сухие и открытые ландшафты, особенно с выходами скал, россыпями камней. Местами обычен.





Азиатский расписной перепел

(Coturnix chinensis)


Самый мелкий представитель куриных (длина 12–15 см, вес 20–57 г). Самка отличается от самца неконтрастной буровато-пестрой окраской. Широко распространен и обычен в самых разнообразных ландшафтах тропической Азии от запада Индии, предгорий Гималаев и востока Китая до Шри-Ланки, Зондских и Филиппинских островов. Обитает также в Новой Гвинее, на островах Меланезии, на востоке и севере Австралии.

Пестрый джунглевый перепел

(Perdicula erythrorhyncha)

В среднем несколько крупнее других джунглевых перепелов, окрашен более контрастно. Обитает в западных, центральных и северо-восточных районах Индии, в горах встречается на высоте до 2000 м. Образ жизни, предпочитаемые ландшафты — как у индийского джунглевого перепела.






Алтайский улар

(*Tetrao gallus altaicus*)

Крупный улар (длина 57 см, вес 3 кг). Обитает в горах Алтая, Саян, Тувы и Монголии. Предпочитает высоту 1300–3000 м, летом поднимается до каменистых тундр и гольцов, зимой спускается почти к подножьям гор. Во время тока закидывает на спину хвост, распушает белое подхвостье и раздувает шейные мешки.



Красная шпорцевая куропатка


(*Gallus spadicea*)


Крупная куропатка (длина 37 см, вес 400 г). Как и другие два вида этого рода, отличается двойными шпорами на ногах. Распространена почти по всей Индии (исключая восток) и на западе Непала. Населяет мозаичные ландшафты различного типа, в горах поднимается на высоту до 2300 м. Обычна.

Разноцветная шпорцевая куропатка

(*Gallus lunulata*)

Заметно мельче красной шпорцевой куропатки. Замещает ее на востоке Индостана. В центральных районах Индии оба вида встречаются вместе. Предпочитает криволесье, бамбуковые и кустарниковые заросли.





Тайваньская бамбуковая куропатка


(*Bambusicola thoracicus sonorivox*)

Средних размеров куропатка (длина 31 см, вес 340 г). Предпочитает держаться в подлеске бамбуковых лесов и зарослей высокотравья на высоте до 1000 м. Этот подвид китайской бамбуковой куропатки описан Гульдом в 1863 г. по экземплярам, добытым в Тайване. Гульд считал его самостоятельным видом.

Красноголовая куропатка

(*Haematoryx sanguiniceps*)

Мелкая куриная птица (длина 25 см, вес 330 г). Обитатель внутренних районов Борнео, встречается в горных лесах на высоте 1000—1500 м. Скрытный вид.





Цейлонская шпорцевая
куропатка

(Gallinago bicalcarata)


Несколько мельче красной шпорцевой
куропатки. Обитатель Шри-Ланки,
встречается в лесах на высоте до 1500 м.
Довольно редкий, уменьшающийся
в числе вид.

Черноголовый трагопан

Tragopan melanocephalus

Трагопаны — крупные короткохвостые фазаны с крапчатым или глазчатым оперением. Черноголовый трагопан (длина до 73 см, вес 2,15 кг) распространен от Пакистана до Кумаона. Предпочитает сухие сосняки и дубняки в горах на высоте 2000–3600 м. Во время тока кожные украшения самца увеличиваются в несколько раз от прилива крови, петух ходит вокруг самки церемонным шагом, затем становится перед ней, трясет «бородой», «чертит» крыльями грунт, распускает хвост, шипит и фыркает. Включен в Международную Красную книгу.







Китайский трагопан

(*Tragopan caboti*)

Самый мелкий трагопан (длина 50–61 см, вес 900–1400 г). Обитатель невысоких лесистых хребтов на юго-востоке Китая, встречается на высоте не более 800–1400 м. Впервые описан Гульдом в 1857 г. В настоящее время из-за вырубki лесов численность китайского трагопана сокращается. Включен в Международную Красную книгу.

Каштановобрюхий коклас

(*Pucrasia macrolopha castanea*)

Окраска самцов кокласа очень изменчива географически. Выделяют 10 подвидов, большинство из них в XIX веке рассматривались как самостоятельные виды. У данного подвида, описанного Гульдом в 1855 г., каштановые тона с брюха переходят на верхнюю сторону тела. Обитает на востоке Афганистана и севере Пакистана.

Тибетский сермун

(*Ithaginis cruentus geoffroyi*)


Обитатель горных можжевельниковых лесов и субальпийских кустарников в Гималаях и в горах на западе Китая. Встречается на высоте 2700–4400 м, зимой спускается ниже. Окраска самцов очень изменчива. Выделяют до 14 географических рас, у *Ithaginis cruentus geoffroyi*, распространенного на некоторых хребтах в юго-восточных районах Тибета, не развиты соломенные и малиновые тона на нижней стороне тела, а пепельно-серый цвет оперения сменяется подчас травянисто-зеленым.



Трагопан-сатир

(*Tragopan satyra*)

Распространен в Центральных и Восточных Гималаях, на востоке Тибета. Встречается в лесах, кустарниках, зарослях бамбука на высоте 2100–4200 м. Синие «рожки» в поднятом состоянии достигают длины 7–8 см, отсюда видовое название в честь греческого мифологического персонажа. Немногочисленный вид.



Глазчатый трагопан


(Tragopan temminckii)

Самый обычный и широко распространенный трагопан. Обитает в зарослях бамбука, рододендрона и смешанных лесах на востоке Гималаев, в горах Бирмы, Сычуани, на севере Вьетнама. Поднимается на высоту не выше 3500 м.

Сиамский фазан-калидж

(Lophura leucomelanos lineata)

Представитель крупного рода лофур, или куриных фазанов (длина самца до 74 см, самки — до 60 см, вес до 1,1 кг). Окраска самцов очень изменчива (от блестяще-черной до струйчато-серой). Выделяют около 10 подвидов. Сиамский — самый светлый из них, распространен на юго-востоке Бирмы, юге и западе Таиланда. Предпочитает леса с хорошо развитой подстилкой и кустарниковым ярусом. Встречается на высоте от уровня моря до 3700 м. Обычен.





Серебряный фазан

(Lophura nycthemera)

Похож на фазана-калиджа. Обитает в Индокитае и на юге Китая. Образует не менее 15 подвидов, различающихся окраской самцов (от темно-серой до черно-белой). На рисунке типичный серебряный фазан (номинативный вид) — наиболее крупный (длина самца до 125 см, вес до 2 кг), длиннохвостый с контрастным оперением. Обитает на юге Китая и севере Вьетнама. Предпочитает леса разного типа, в горах встречается

в сосняках и бамбуковых зарослях на высоте до 2000 м. Был популярен у китайцев еще 5 тысяч лет назад, изображался на миниатюрах, вышивках, шелкографиях. В настоящее время одна из наиболее многочисленных декоративных куриных птиц в зоопарках, однако многие дикие популяции исчезают.



Серобрюхий трагопан

(*Tragopan blythii*)

Крупный трагопан. Распространен на некоторых хребтах Бутана, Ассама (восток Индии), на западе Бирмы и крайнем юге Китая. Встречается в смешанных лесах, бамбуковых зарослях на высоте 1500–2600 м. Включен в Международную Красную книгу.